

Ankieta

Nazwisko, imię _____

Adres _____

Wszystkie odpowiedzi odnoszą się do ostatnich 4 tygodni	Nigdy	Mniej niż raz na pięć przypadków	Mniej niż w połowie przypadków	W około połowie przypadków	Więcej niż w połowie przypadków	Prawie zawsze
1. Jak często miał Pan uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego po oddaniu moczu?	0	1	2	3	4	5
2. Jak często zaobserwował Pan w trakcie oddawania moczu, że strumień moczu zatrzymał się i ponownie zaczął lecieć (zacinanie się)?	0	1	2	3	4	5
3. Jak często musiał Pan oddawać moczu ponownie, w czasie krótszym niż 2 godziny po jego poprzednim oddaniu?	0	1	2	3	4	5
4. Jak często miał Pan problemy z odwlekaniem oddawania moczu?	0	1	2	3	4	5
5. Jak często obserwował Pan słabszy strumień moczu?	0	1	2	3	4	5
6. Jak często musiał Pan przed oddaniem moczu przeć lub włożyć większy wysilek, aby rozpocząć oddawanie moczu?	0	1	2	3	4	5
7. Jak często musiał Pan wstawać w nocy w celu oddania moczu? (Miarodajny jest okres czasu od położenia się do łóżka do wstania rano.)	0	1	2	3	4	5
Suma punktów IPSS =						

Ocena

IPSS 0-7: Ma Pan łagodne objawy lub w ogóle Pan ich nie ma. Z Pana prostaty jest wszystko w porządku. Jeśli jest Pan w wieku powyżej 45 roku życia, powinien Pan się raz do roku zgłosić do lekarza w celu wczesnego rozpoznania raka.

IPSS 8-19: Występuje u Pana umiarkowane nasilenie objawów. Przyczyną Pana dolegliwości może być choroba prostaty. Należy porozmawiać ze swoim lekarzem.

IPSS 20-35: Występują u Pana objawy o znacznym nasileniu. Należy niezwłocznie porozmawiać z lekarzem.

Za pomocą dodatkowego pytania, lekarz może wykryć pogorszenie jakości życia

Jak by się Pan czuł, gdyby Pana terażniejsze dolegliwości ze strony układu moczowego utrzymywały się w dalszym ciągu na obecnym poziomie?	Świetnie	Dobrze	Raczej dobrze	Średnio	Raczej źle	Źle	Bardzo źle
	0	1	2	3	4	5	6


STADA